

# MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 3

Týden: 21

Období: 25. 5. - 1. 6. 2021



## PADLÍ RÉVOVÉ ●

Obecně lze konstatovat, že na všech lokalitách nyní sílí především tlak plísně révy. Vývojový trend u padlí zůstává neměnný, podmínky pro primární infekce nejsou vyhovující. Přesto na některých místech s nižšími srážkovými úhrny k velmi mírnému posunu mohlo dojít. Doporučujeme mít se na pozoru a průběžně na vinicích sledovat prvotní příznaky (málo patrné zelenožluté, matné, jemně stříbřité skvrny). K lepší identifikaci doporučujeme podívat se na list z profilu ve výšce očí, kdy je lépe viditelný šedobílý povlak mycelia. **Nadále neočekáváme významnou změnu zvýšení rizika padlí. V každém případě doporučujeme při každé aplikaci přidávat do tankmixu síru (KUMULUS, SULFOMAX) jakožto nezastupitelnou složku fungicidní a baktericidní ochrany révy.** Relativně dobře z pohledu plísní jsou na tom vinice v okolí Kobyli. Zde padlí ani peronospoře nebyly doposud vytvořeny vhodné podmínky k dalšímu rozvoji.

## PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

Deštivé a chladné počasí v minulém týdnu způsobilo na mnoha místech další zvýšení rizika rozvoje plísně révové. Podle prognostických grafů je tak atakována hranice kalamitního výskytu. Na rizikových místech lze pozorovat první nepatrné olejové skvrny na listech, dobře viditelné symptomy jsou zejména na nejnižše položených listech. Rozhodně není vhodné déle čekat s fungicidní ochranou keřů. **Podmínky pro klíčení oospor již byly splněny. U velmi raně kvetoucích odrůd a dále tam, kde již evidujeme silné olistění keřů, doporučujeme použít přípravky na bázi systémového účinku.** U porostů s méně koncentrovanou listovou plochou lze nadále aplikovat kontaktní fungicidy. Po odeznění dešťů a nárůstu denních teplot lze předpokládat zvýšený výskyt projevů choroby. Také proto je nutné co nejdříve provedení ochrany keřů spolehlivými přípravky k tomu určenými.


Riziko rozvoje: ● slabé

● střední

● silné



## Výhled počasí



## Další důležité informace:

V uplynulém období jsme přešli z velmi vysokých teplot do chladnějšího a hlavně srážkově bohatého období. Půdy jsou z pohledu nasycenosti ve výborném stavu, na nedostatek srážek si rozhodně nemůžeme stěžovat. V dalších dnech nečekáme změnu v charakteru počasí. Konec května bude nadále teplotně normální či lehce podprůměrný. **Po odeznění dešťů bude nutné urychleně zahájit preventivní ochranu vinic a aplikace postřiků provádět intenzivně.** Panující vhodné vláhové podmínky jsou příznivé nejen pro révu. V následujících dnech **lze očekávat také silnější růst plevelů**, které vytváří ideální zázemí pro různé choroby a škůdce či přímo konkurují mladším keřům révy. V takových případech doporučujeme použití přípravků **ROUNDUP KLASIK PRO** nebo **TOUCHDOWN QUATTRO**.



V následujícím období bude **vhodný čas k provedení listových rozborů**. V našich laboratořích lze provést základní (základní živiny) a rozšířený rozbor listů (základní živiny a mikroživiny) s následným přesným doporučením listových hnojiv včetně dávek.

INTENZITA  
INFEKČNÍHO  
TLAKU DLE  
VYBRANÝCH  
LOKALIT

obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Blatnice	slabý	střední
Bzenec	slabý	střední
Čejkovice	slabý	střední
Kobylí	slabý	střední
Lednice	slabý	střední
Mikulčice	střední	slabý
Mikulov	slabý	střední
Nosislav	slabý	střední
Pavlov	slabý	silný
Popice	slabý	střední
Přítluky	slabý	střední
Sedlec	slabý	střední
Strážnice	slabý	střední
Svatobořice	slabý	střední
Valtice	slabý	střední
Velké Bílovice	slabý	střední
Velké Pavlovice	střední	střední
Znojmo	slabý	střední
Modra (SK)	slabý	střední
Šenkvice (SK)	střední	střední
Nové Zámky (SK)	slabý	střední
Golianovo - Darmoty (SK)	slabý	střední

Legenda

slabý

střední

silný

## DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

-

-

MELODY COMBI

RIDOMIL GOLD

TALENDO

MAGNICUR CORE

CASSIOPEE

RIDOMIL GOLD

KUMULUS

KUMULUS

PEGASO F

CHAMPION