

Č.10

TÝDEN: 30.

OBDOBÍ: 22.7.-28.7.2024

AKTUÁLNĚ

Po sérii teplejších dnů nás čeká mírné ochlazení. Očekáváme sérii bouřek z tepla následovaných několika dny s mírnějšími teplotami a vyšším větrem. Počasí nadále přeje rozvoji infekcí v napadené vegetaci. Hrozny se nacházejí ve fázi začátku vyžrávání- vybarvování [Obr. 1]. Uvažte aplikaci posledních výraznějších postřiků, jelikož ochranné lhůty jsou vzhledem k výhledu začátku vinobraní neúprosné.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●●

Nyní napadá mladé listy [Obr. 2] a jejich ztráta může výrazně omezit vyžrávání hroznů i dřeva. Vysoké tlaky plísně pozorujeme i nadále, nicméně se projevuje již pouze na listové ploše. Je důležité procházet porosty, nepodceňovat sledované příznaky a včas zasáhnout.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: **PROFILER, MILDICUT, MOMENTUM, FOLPAN.**

PADLÍ RÉVOVÉ ●

V případě padlí můžeme pozorovat nárůst infekcí na bobulích. Silněji napadené vinice již sledujeme dokonce ve stádiu „výhřezu semen“ [Obr. 3]. Konec fenofáze uzavírání hroznů a počátek fenofáze vyžrávání může být vzhledem k ochranným lhůtám postřiků poslední možností k výraznému ošetření. Porosty je potřeba pravidelně procházet a kontrolovat.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: **ALCEDO, VIVANDO, LUNA EXP, TOPAS.**

PLÍSEŇ ŠEDÁ

Dle vyžrávání odrůd a podmínek na stanovišti je přítomnost *botrytídy* očekávána v porostech poškozených kroupami.

Z PŘÍPRAVKŮ DOPORUČUJEME: **SCALA, SWITCH, TELDOR, MAGNICUR, MELODY COMBI, SERENADE ASO**

Semafor rizika rozvoje patogenu: ● mírné ● střední ● vysoké



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

SLEDOVÁNÍ OCHRANNÉ LHŮTY

POSTŘÍKŮ - ochranná lhůta je daná počtem dní a znamená MINIMÁLNÍ ochrannou dobu od aplikace po případnou sklizeň. Po tuto uvedenou dobu by se hrozen neměl zpracovávat... Vzhledem k průběhu ročníku se vinobraní blíží mílovými kroky a je možné, že tam, kde se loni začínalo 15. září se tento rok může začínat již na přelomu září. Je proto velmi důležité sledovat OCHRANNOU LHŮTU postřiků, především těch proti padlí a plísni, u kterých by jsme tedy již mohli plánovat i poslední aplikaci před sklizní.

ZPRÁVA ÚKZÚZ - bylo vydáno doporučení k sledování výskytu kříška révového (*Scaphoideus titanus*) [Obr. 4] na území Jižní Moravy. Dospělci přenášejí virovou chorobu fytoplazmového zlatého žloutnutí. Lokalitami výskytu byli Běclav, U. Hradiště a Znojmo. Doporučujeme provést monitoring a případné ošetření přípravky SIVANTO PRIME (profi) nebo SANIUM SYSTEM (hobby) [Obr. 10].



Obr. 10

KRUPOBITÍ – smutný to pohled na domláčené vinice [Obr. 5-6] našich kolegů. Ale hlavy vzhůru, réva si poradí se vším a pokud zasáhnete včas (24 hod), dokážete se vyhnout vážným následkům, i když to už nebude na fotku [Obr. 7-8]. Použijte standardní přípravky potlačující rozvoj patogenu. Vhodnou pomocí je též aplikace VITISANU [Obr. 9] a výživy k posílení regenerace.



Obr. 9

BÍLÁ HNILOBA – typickým projevem je zbarvení bobulí do odstínů mléčné kávy, povrch bobule je neforemní a projevuje se současně i octovatění. Doporučujeme přípravky CASSIOPEE, LUNA EXP, MELODY COMBI, SERENADE ASO.



Obr. 4



Obr. 8



Obr. 5




Obr. 6



Obr. 7




DLOUHODOBÝ VÝHLED POČASÍ



Dle modelu

yr.no – stanice Kobylí /CZ/

HODNOCENÍ INTENZITY VÝSKYTU INFEKČNÍHO TLAKU VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH



Hodnocení:

plíseň: Model hodnocení podle Šteberly padlí: Model signalizace podle Kasta

infekční tlak slabý střední silný

SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň révová

padlí révové

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

CYMBAL

FOLPAN

DOMARK

BELANTY

MOMENTUM

ZORVEC VINABEL

PRONTO

SERCADIS

FLOWBRIX

ALGINURE

VITISAN

MAGNICUR CORE

PROFI

HOBBY

SWITCH

SCALA

TELDOR

SERIFEL

SERENADE ASO

VITISAN

plíseň šedá

riziko napadení

silné

střední

slabě