

AKTUÁLNĚ



Č.4

TÝDEN: 24.

OBDOBÍ: 10.6.-17.6.2024



Na všech pozorovaných stanovištích již pozorujeme intenzivnější postup fáze kvetení. Průběh počasí, zejména vydatná srážková činnost může celkový průběh kvetení prodloužit. Celková doba kvetení by měla zabrat 7-14 dní. Rannější odrůdy jsou již na mnoha stanovištích ve fázi 80-90 % odkvětu, případně již dokvétají. Vzhledem k rozvoji srážkové činnosti bude stěžejní pohlídat postřik ve fázi po odkvětu. . Výhled počasí nadále slibuje vydatné srážky, vysokou vzdušnou vlhkost a ideální denní i noční teploty pro rozvoj patogenů. Pro lepší aplikaci postřiků doporučujeme provést zastrčení letorostů do drátěnky, dále mírné prosvětlení listové stěny a údržbu meziřadí, odkud se může šířit infekce. Dále můžeme ve fázi po odkvětu pozorovat kvalitu odkvetené násady a míru sprchnutí bobulí.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Vhodné podmínky pro rozvoj infekce jsou splněny na většině stanovišť. V následujícím období budou podmínky šíření nadále příznivé pro rozvoj patogena, a to díky vydatným srážkám a vysoké vlhkosti vzduchu. Šíření se může zpomalit díky předpokládanému ochlazení Vinice je potřeba sledovat a udržovat vzdušnost listové stěny.

Z PŘÍPRAVKŮ DOPORUČUJEME: PROFILER, CASSIOPEE, MILDICUT, ALTELA, DEFENDER DRY, FOLPAN, CHAMPION, FLOWBRIX.

PADLÍ RÉVOVÉ

Na většině sledovaných lokalit se podmínky pro rozvoj a šíření patogena drží ve vyšších středních indexových hodnotách. Není radno podcenit ranní odpar a výraznou vlhkost vzduchu. Po odkvětu jsou bobule na padlí velice citlivé ... Po dokončení fáze kvetení je důležité udržovat prosvětlenou a vzdušnou listovou stěnu pomocí podlomu a podpořit tím nepřímou ochranu, vysychání ovlhčení a zároveň tím zlepšit účinnou aplikaci postřiků.

Z PŘÍPRAVKŮ DOPORUČUJEME: ALCEDO, VIVANDO, SONATA, LUNA EXP, DYNALI, KUMULUS WG, SULFOMAX, TOPAS.

semafor rizika rozvoje patogenu:  mírné  střední  výrazné





SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH PATOGENŮ

NÁŠ TIP

Výhled počasí nás nechává stále ve střehu. Relativně vlhké periody jsou doplněny ideálními teplotami pro rozvoj patogena. Pro minimalizaci šíření infekce je důležité udržovat porost v meziřadí. Pro zlepšení aplikace postřiků je vhodné mít zastrčené letorosty v drátěnce. V období po odkvětu je velmi důležité provzdušnit listovou stěnu podlomem a vylomením pár listů kolem hroznů.

Náš tip: Vzhledem k aktuálnímu stavu vývoje révy bude další postřik velmi důležitý. Není ale radno podcenit aktuální výhled počasí. Doporučujeme s postřikem přidat vhodné smáčedlo. **AgroVital** je multifunkční pomocná látka, která prodlužuje ochrannou lhůtu postřiků a umožňuje lepší vstřebávání účinné látky.



VÝŽIVA


Příliš silné srážky ovlivňují správný průběh kvetení. Ať už ve fázi kvetení nebo dokvětu, zejména u citlivých odrůd ke sprchávání může dojít k negativnímu ovlivnění opylení a tvorbě násady. V jistém rozsahu je možné podpořit rostliny nasazením vhodné výživy. Doporučujeme kombinaci listové výživy na bázi dusíku a stopových prvků, jako například **VÍNOFIT** a **WUXAL SUPER**

Poškození květenství, listů a vrcholků způsobené kroupami je aktuálně problémem mnoha lokalit. **DRAFOS** svým složením podporuje kvetení a vyžívání pletiv. Jeho benefitem je tendence změny pH na povrchu rostliny, čímž zamezuje rozvoji houbových chorob.

V současném výhledu doporučujeme pro vývoj květenství a minimalizaci sprchávání aplikovat vhodnou výživu, zejména stopových prvků (Molybden, Zn, B). Výživa **VEGAFLOR** dodává užitečné živiny, podporuje růst a pomáhá révě odolávat houbovým chorobám.



DLOUHODOBÝ VÝHLED POČASÍ



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH PATOGENŮ

HODNOCENÍ INTENZITY VÝSKYTU INFEKČNÍHO TLAKU VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

obec	plíseň réвовá	padlí réвовé
BLATNICE	střední	střední
BZENEC	střední	silný
HNANICE	silný	silný
KOBYLÍ	slabý	silný
MIKULČICE	silný	střední
MIKULOV	silný	střední
NOSISLAV	střední	střední
PAVLOV	silný	silný
POPICE	silný	střední
SEMLEC	silný	střední
STRÁŽNICE	střední	silný
SVATOBOŘICE	silný	střední
VALTICE	střední	silný
VELKÉ BÍLOVICE	silný	silný
VELKÉ PAVLOVICE	střední	silný
VRBOVEC	silný	střední
ZNOJMO	silný	silný
MODRA (SK)	střední	silný
SUCHÁ N.P. (SK)	slabý	střední

infekční tlak slabý střední silný

Hodnocení:

plíseň: Model hodnocení podle Šeberly

padlí: Model signalizace podle Kasta



SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň révová

padlí révové

PROFI

HOBBY

FOLPAN GOLD

FOLPAN

CABRIO TOP

ZORVEC VINABEL

DEFENDER DRY

CHAMPION

PROFI

HOBBY

SPIROX

TOPAS

LUNA MAX

DYNALI

KUMULUS

KARATHANE

riziko napadení

silné

střední

slabé