



# SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH PATOGENŮ

Č.9

TÝDEN: 29.

OBDOBÍ: 15.7.-21.7.2024

## AKTUÁLNĚ

Výhledově nás čeká i nadále série tropických dnů s pocitovými teplotami nad 30 °C. Vysoké teploty mají tendenci zpomalit nebo zastavit šíření patogenů, nikoliv jej ale z vinice odstranit. Na vinicích pozorujeme vývoj infekcí jak na bobulích tak na listech. Riziko mimořádných bouřkové aktivit z tepla je nadále vytrvalé a mnohdy s sebou nese i lokální riziko krupobití. Zvažte intenzitu odlistění nad hroznem kvůli ochraně proti kroupám a slunci.

## PLÍSEŇ RÉVOVÁ ● ●

Napadené můžou výt mladé listy a jejich ztráta může výrazně omezit vyžívání hroznů i dřeva. Vysoké tlaky plísně z posledních dnů pozorujeme již pouze na listové ploše. Je důležité procházet porosty, nepodceňovat sledované příznaky a včas zasáhnout.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: **PROFILER, CASSIOPEE, MILDICUT, MOMENTUM, FOLPAN.**

## PADLÍ RÉVOVÉ ●

Počasí je nakloněno proti rozvoji padlí – smývání konidií deštěm a teploty nad 32 °C výrazně zpomalují rozvoj. Nesmíme ale podcenit existující příznaky na listech a na bobuli kvůli uzavírání hroznů. Porosty je potřeba pravidelně procházet a kontrolovat přítomnost symptomů i stav listové stěny.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: **ALCEDO, VIVANDO, LUNA EXP , TOPAS, VITISAN.**

## PLÍSEŇ ŠEDÁ

Máme téměř za sebou citlivou fázi uzavírání hroznů. Před uzavřením by se mněl aplikovat preventivní postřik proti plísní šedé. Pozor na mimořádné okolnosti a poškození kroupami!

Z PŘÍPRAVKŮ DOPORUČUJEME: **SCALA, SWITCH, TELDOR, MAGNICUR, MELODY COMBI, SERENADE ASO**

Semafor rizika rozvoje patogenu: ● mírné ● střední ● vysoké





**ZNAČENÍ NAPADENÝCH KEŘŮ** - v tomto období je vidět nejvíce příznaků (zbarvení čepele, chřadnutí,...) a tak máme možnost sledování keřů vykazujících příznaky napadení houbovými chorobami dřeva (ESCA, Eutypové odumírání, a jiné). Celkový stav rostlin může napovědět, jestli má smysl se pokoušet je zachránit. Symptomatické jedince můžete nyní značit a případně se pokusit o omlazení z nižší etáže kmínku.

### **SLEDOVÁNÍ OCHRANNÉ LHŮTY**

**POSTŘÍKŮ** - ochranná lhůta je daná počtem dní a znamená MINIMÁLNÍ ochrannou dobu od aplikace po případnou sklizeň. Po tuto uvedenou dobu by se hrozen neměl zpracovávat... Vzhledem k průběhu ročníku se vinobraní blíží mílovými kroky a je možné, že tam, kde se loni začínalo 15. září se tento rok může začínat již na přelomu září. Je proto velmi důležité sledovat OCHRANNOU LHŮTU postřiků, především těch proti padlí a plísni, u kterých by jsme mohli plánovat i poslední aplikaci před sklizní.

**KRUPOBITÍ** – Smutný to pohled na domláčené vinice našich kolegů. Ale hlavy vzhůru, réva si poradí se vším a pokud zasáhnete včas (24 hod), dokážete se vyhnout vážným následkům, i když to už nebude na fotku. Používejte standardní přípravky potlačující rozvoj patogenu. Vhodnou pomocí je též aplikace VITISANU a výživy k posílení regenerace.




**BÍLÁ HNILOBA** – typickým projevem je zbarvení bobulí do odstínů mléčné kávy, povrch bobule je neforemní a projevuje se současně i octovatění. Doporučujeme přípravky CASSIOPEE, LUNA EXP, MELODY COMBI, SERENADE ASO.

**PLÍSEŇ ŠEDÁ** – fáze uzavírání je citlivá i bez dalších poškození. Do karet infekci nahrává vysoká vlhkost vzduchu a ranní rosa, srážky, problémové lokality, půdní nasycenost, údržbu porostu, zdravotní stav nebo citlivost odrůdy a klonu hroznů. Seznam vhodných postřiků je na první a poslední stránce dokumentu.



## DLOUHODOBÝ VÝHLED POČASÍ



## HODNOCENÍ INTENZITY VÝSKYTU INFEKČNÍHO TLAKU VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

obec	plíseň réвовá	padlí réвовé
BLATNICE	silný	střední
BZENEC	střední	střední
HOSTĚRADICE	silný	střední
HNANICE	střední	silný
KOBYLÍ	střední	silný
MIKULČICE	silný	střední
MIKULOV	střední	střední
NOSISLAV	střední	silný
PAVLOV	silný	střední
POPICE	silný	střední
SEDLEC	silný	střední
STRÁŽNICE	střední	střední
SVATOBŔICE	silný	střední
VALTICE	střední	střední
VELKÉ BÍLOVICE	silný	střední
VELKÉ PAVLOVICE	střední	střední
VRBOVEC	silný	střední
ZNOJMO	střední	střední
MODRA (SK)	střední	střední
SUCHÁ N.P. (SK)	slabý	střední



Hodnocení:

plíseň: Model hodnocení podle Šteberly padlí: Model signalizace podle Kasta

infekční tlak slabý střední silný

# SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň révová

padlí révové

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

CYMBAL

CHAMPION

DOMARK

BELANTY

MELODY COMBI

ZORVEC VINABEL

PRONTO

SERCADIS

FLOWBRIX

ALGINURE

VITISAN

MAGNICUR CORE

PROFI

HOBBY

SWITCH

SCALA

MELODY COMBI

SERIFEL

SERENADE ASO

VITISAN

plíseň šedá

riziko napadení

silné

střední

slabé