

# ATAK NASTRAHA NA MRAVENCE IMIDACLOPRID

Nástražní stanička s insekticidním gelem proti mravencům

## Pro neprofesionální použití

**Formulace:** ve formě gelu k přímému použití

**Účinná látka:** Imidakloprid

**Chemická skupina:** Nitroguanidiny (Neonicotinoidy)

**Koncentrace:** 0.01% w/w

**Číslo povolení:** CZ-0011601-0000

### Cíloví škůdci:

mravenec faraon (*Monomorium pharaonis*), mravenec argentinský (*Linepithema humile*).

### Způsob účinku:

Účinná látka imidakloprid narušuje v těle hmyzu spojení mezi neurony. To způsobuje poruchy v přenosu impulsů v nervech, které je smrtelné pro zasažené škůdce.

Mravenci jsou lákáni potravními atraktanty obsaženými v gelu.

Gel je pak zanášen do hnízd, mezi ostatní příslušníky kolonie, kde způsobuje otravu (kontaktně i požerově) a následně i smrt všech jedinců během 10 dní, bez ohledu na jednotlivá vývojová stadia (larvy i dospělce).

### Návod k použití:

Před aplikací odstraňte mravencům pokud možno všechny zdroje potravy (odpadky, zbytky jídla apod.) z ošetřovaného prostoru, to podpoří konzumaci gelu. Pokud je přítomnost mravenců pouze předpokládána nebo sporadická, je doporučeno používat gel v nástražních staničkách. Kontrolujte návnady jednou týdně. Při prohlídce kontrolujte ošetřenou plochu a pokud je potřeba doplňte gel. Aplikujte přípravek mimo dosah přímého slunečního záření nebo zdrojů tepla (např. neumísťujte ho pod radiátory). Vyhněte se nepřetržitému používání výrobku. V případě, že zamoření přetrvává navzdory pokynům na etiketě, obraťte se pro vyhubení škůdců na profesionální firmu. Informujte distributora povolení v případě, že ošetření je neúčinné. Při venkovní aplikaci by měla být návnada umístěna pouze na zpevněném povrchu (neaplikovat na půdu).

ATAK NASTRAHA NA MRAVENCE IMIDACLOPRID je doporučen pro použití:

**Bytové prostory** (včetně kuchyní)

**Potravinářské provozy:**

Výrobní: výrobní závody, kuchyně veřejného stravování, jatka apod. Sklady: prodejny potravin, skladiště, sklady surovin, sila (mimo prostorů se skladovaným obilím) apod. Provozovny: restaurace, veřejné kuchyně, apod.

**Veřejné budovy:** Nepřetržitě navštěvované prostory včetně nemocničních oddělení, hotelů, veřejných lázní, obecních budov, kostelů, hal, komunitních center, kin, apod.

### Aplikační dávka:

**Vnitřní prostor** (0,35 g/m<sup>2</sup>) – 1 box (stanička) je na 4 m<sup>2</sup>.

**Venkovní prostor** (0,23 g/m obvod budovy) – 1 box (stanička) je na 6 m.

Přípravek může být používán nepřetržitě po dobu 2-3 měsíců bez nutnosti vyměnit otevřené nástražné staničky nebo nezkonsumované nástražky. Maximální počet 12 aplikací za rok.

### Opatření ke zmírnění rizika:

Vyhněte se zbytečnému kontaktu s přípravkem. Nesprávné zacházení může způsobit poškození zdraví.

Nekontaminujte jídlo, krmiva, jídelní nádobí nebo potraviny kontaktem s ošetřeným povrchem.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

### Skladování:

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

### Opatření:

Po použití ATAK NASTRAHA NA MRAVENCE IMIDACLOPRID a před jídlem si umyjte ruce vodou a mýdlem. Neaplikujte gel na površích, kde je jídlo skladováno, připravováno nebo konzumováno. Chraňte potraviny, kuchyňské nádobí a přístroje před kontaminací. Neaplikujte gel na místech přístupných dětem a domácím mazlíčkům.

### První pomoc:

**PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE:** Umývat velkým množstvím vody.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko: Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, 224 91 92 93

### DŮLEŽITÉ: POUŽÍVEJTE PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.

Dodržujte návod k použití, dávkování, podmínky a upozornění na obalech, které jsou dané na základě vlastností výrobku a aplikací, pro něž je přípravek doporučen.

Ošetření by mělo být provedeno v souladu se správnou praxí s ohledem na zvážení všech konkrétních faktorů, které mohou nastat a jsou mimo naši kontrolu (použitý materiál, aplikační podmínky atd.)

Výrobce garantuje kvalitu svého výrobku prodávaného v originálním balení.



### Standardní věty o nebezpečnosti:

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Pokyny pro bezpečné zacházení:

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obal a nespotřebovaný přípravek jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Držitel povolení:

Sharda Europe B.V.B.A.

Heedstraat 158

1730 Asse

BELGIE

Distributor v ČR:

AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71

Brumovice

Tel.: +420 553 626 660, e-mail: [poradna@agrobio.cz](mailto:poradna@agrobio.cz),

[www.agrobio.cz](http://www.agrobio.cz)

UFI: PEDV-G68N-F904-U6NY

Objem: 1,4 g

Číslo šarže: uvedeno na obale

Datum spotřeby: (2 roky od data výroby)